

Indiana 2020-2021 Required and Recommended School Immunizations

Grade	Required		Recommended
Pre-K	3 Hepatitis B 4 DTaP (Diphtheria, Tetanus & Pertussis) 3 Polio	1 Varicella (Chickenpox) 1 MMR (Measles, Mumps & Rubella) 2 Hepatitis A	Annual influenza
K-5th grade	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio	2 Varicella 2 MMR 2 Hepatitis A	Annual influenza
6th-11th grade	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio 2 Varicella	2 MMR 2 Hepatitis A 1 MCV4 (Meningococcal) 1 Tdap (Tetanus, Diphtheria & Pertussis)	Annual influenza 2/3 HPV (Human papillomavirus)
12th grade	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio 2 Varicella	2 MMR 2 Hepatitis A 2 MCV4 1 Tdap	Annual influenza 2/3 HPV 2 MenB (Meningococcal)

HepB: The minimum age for the 3rd dose of Hepatitis B is 24 weeks of age.

DTaP: 4 doses of DTaP/DTP/DT are acceptable if 4th dose was administered on or after child's 4th birthday.

Polio*: 3 doses of Polio are acceptable for all grade levels if the 3rd dose was given on or after the 4th birthday and at least 6 months after the previous dose.

*For students in grades K-10, the final dose must be administered on or after the 4th birthday and be administered at least 6 months after the previous dose.

Varicella: Physician documentation of disease history, including month and year, is proof of immunity for children entering preschool through 12th grade. Parent report of disease history is not acceptable.

Tdap: There is no minimum interval from the last Td dose.

MCV4: Individuals who receive dose 1 on or after the 16th birthday only need 1 dose of MCV4.

Hepatitis A: The minimum interval between 1st and 2nd dose is 6 calendar months. 2 doses are required for all grades Pre-K through 12.



Indiana State Department of Health,
Immunization Division

(800) 701-0704

Calendario de vacunación escolar obligatorio y recomendado de Indiana 2020-2021

Grado	Vacunas obligatorias		Vacunas recomendadas
Preescolar	3 Hepatitis B 4 DTTa (difteria, tétanos y tosferina acelular) 3 Polio	1 Varicela 1 SRP (sarampión, rubéola y paperas)	Antigripal anual
Nivel inicial (K) a 5.º grado	3 Hepatitis B 5 DTTa 4 Polio	2 Varicela 2 SRP 2 Hepatitis A	Antigripal anual
De 6.º a 11.º grado	3 Hepatitis B 5 DTTa 4 Polio 2 Varicela	2 SRP 2 Hepatitis A 1 MCV4 (meningocócica) 1 DTTa de refuerzo	Antigripal anual 2/3 PVH (papilomavirus humano)
12.º grado	3 Hepatitis B 5 DTTa 4 Polio 2 Varicela	2 SRP 2 Hepatitis A 2 MCV4 1 DTTa de refuerzo	Antigripal anual 2/3 PVH 2 Meningococo grupo B

Hepatitis B: la edad mínima para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la Hepatitis B es de 24 semanas.

DTTa: se aceptan 4 dosis de DTTa/DTT/DT si la cuarta se le dio a partir de los 4 años.

Polio*: se aceptan 3 dosis contra la poliomiелitis para todos los grados si la tercera dosis fue a partir de los 4 años y si transcurrieron 6 meses de la dosis anterior.

* Para los estudiantes entre nivel inicial (K) y 10.º grado, la última dosis debe darse a partir de los 4 años con 6 meses entre una dosis y otra.

Varicela: la constancia de enfermedades previas emitida por el médico, con el año y el mes, sirve como prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta 12.º grado. No se aceptan informes de los padres sobre los antecedentes de enfermedades.

DTTa de refuerzo: no hay un intervalo mínimo que deba transcurrir desde la última dosis de DT.

MCV4: las personas que reciban la primera dosis a partir de los 16 años solo necesitan 1 dosis de la vacuna.

Hepatitis A: el intervalo mínimo que debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendarios. Los niños entre preescolar y 12.º grado deben contar con 2 dosis.



División de vacunación del
Departamento de Salud del Estado de Indiana
(800) 701-0704